本文引用格式:强萍,丁凯阳.MLL基因重排成人急性B淋巴细胞白血病和急性髓系白血病临床特征及预后危险因素分析[J].安徽医学,2023,44(4):367-371.DOI:10.3969/j.issn.1000-0399.2023.04.002

MLL基因重排成人急性B淋巴细胞白血病和急性髓系白血病临床特征及预后危险因素分析

强萍 丁凯阳

[摘要] **目的** 分析混合谱系白血病基因重排(MLL-r)成人急性B淋巴细胞白血病(B-ALL)和急性髓系白血病(AML)的临床特征、治疗疗效及预后危险因素。**方法** 选取2017年1月至2021年11月中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)血液内科收治的17例MLL-r B-ALL和25例MLL-r AML为研究对象,回顾性分析患者临床特征、治疗疗效及总体生存率,使用COX回归分析影响患者预后危险因素。**结果** MLL-r成人急性白血病诊断时常表现为外周血白细胞异常升高、贫血和血小板减少,诊断时中位白细胞计数为 $46.83(8.13, 99.93) \times 10^9/L$ 。MLL-r B-ALL最常见的重排为MLL-AF4重排;MLL-r AML最常见重排为MLL-AF9和MLL-AF6重排。单纯化疗复发率高,异基因造血干细胞移植可以显著改善患者预后($P < 0.05$)。此外,多因素回归分析影响患者总生存期(OS)的因素,诊断时白细胞计数 $\geq 100 \times 10^9/L$ ($HR=8.030, 95\%CI: 1.327 \sim 48.594, P = 0.023$)及异基因造血干细胞移植($HR=0.079, 95\%CI: 0.015 \sim 0.423, P = 0.003$)为影响MLL-r AML患者OS的因素;异基因造血干细胞移植($HR=0.054, 95\%CI: 0.006 \sim 0.481, P = 0.009$)为影响MLL-r B-ALL患者OS的因素。**结论** MLL-r急性白血病诊断时常表现为白细胞异常升高,单纯化疗复发率高,总体预后不佳,异基因造血干细胞移植可改善患者预后。

[关键词]混合谱系白血病基因;急性淋巴细胞白血病;急性髓系白血病;造血干细胞移植

doi:10.3969/j.issn.1000-0399.2023.04.002

The clinical characteristics and prognostic risk factors of B-lymphoblastic leukemia and acute myelogenous leukemia with MLL gene rearrangement

QIANG Ping, DING Kaiyang

Department of Hematology, the First Affiliated Hospital of USTC, Division of Life Sciences and Medicine, University of Science and Technology of China, Hefei, 230001, China

Funding project: Funding project: Anhui Health Research Project (No.AHWJ2021b078)

Corresponding author: DING Kaiyang, dingkaiy@126.com

[Abstract] **Objective** To explore the clinical characteristics and prognostic risk factors of B-acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) and acute myelogenous leukemia (AML) with mixed lineage leukemia gene rearrangement (MLL-r). **Methods** From January 2017 to November 2021, the clinical data of 17 B-ALL patients and 25 AML patients with MLL gene rearrangement were retrospectively analyzed. Patient characteristics, treatment response, and overall survival were analyzed. Moreover, the prognostic factors in patients with MLL gene rearrangement were also evaluated based on a COX model. **Results** Leukocytosis was the main symptom of adult acute leukemia with MLL gene rearrangement, and the median leukocyte count was $46.83(\text{ranging from } 8.13 \text{ to } 99.93) \times 10^9/L$. MLL-AF4 was the most common partner gene in patients with B-ALL, while MLL-AF9 rearrangement and MLL-AF6 rearrangement were the most common partner genes in patients with AML. Moreover, the prognostic factors in patients with MLL gene rearrangement were also evaluated based on a Cox model. $WBC \geq 100 \times 10^9/L$ ($HR=8.030, 95\%CI: 1.327 \sim 48.594, P = 0.023$) and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) ($HR=0.079, 95\%CI: 0.015 \sim 0.423, P = 0.003$) were risk factors for OS in AML patients, while allo-HSCT ($HR=0.054, 95\%CI: 0.006 \sim 0.481, P = 0.009$) was a risk factor for OS in patients with B-ALL. **Conclusions** Leukocytosis is the main symptom of patients with MLL gene rearrangement. Patients present a high recurrence rate after treatment with conventional chemotherapy, and allo-HSCT can significantly improve the prognosis of these patients.

[Key words] Mixed-lineage leukemia; Acute lymphoblastic leukemia; Acute myelogenous leukemia; Hematopoietic stem cell transplantation

基金项目:安徽省卫生健康委科研项目(编号: AHWJ2021b078)

作者单位:230001 安徽合肥 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)血液内科

通信作者:丁凯阳, dingkaiy@126.com

混合谱系白血病 (mixed-lineage leukemia, MLL) 基因又称为 KMT2A 基因, 位于 11 号染色体 q23 区域, 编码转录辅激活子, 在造血发育过程中发挥重要调节作用^[1]。MLL 基因可以通过染色体易位形成不同类型的基因重排, 最终导致急性淋巴细胞白血病 (acute lymphoblastic leukemia, ALL) 和急性髓系白血病 (acute myelogenous leukemia, AML) 的发生。WHO 将具有 MLL 基因重排 (MLL gene rearrangement, MLL-r) 急性白血病单独列为 11q23/MLL 白血病, 其具有独特的生物学和临床特征, 常规化疗复发率高, 总体预后不佳^[2-5]。新型靶向药物、免疫治疗及造血干细胞移植有望改善 MLL-r 急性白血病患者预后^[4,6-7]。本研究通过回顾性分析 17 例 MLL-r B-ALL 和 25 例 MLL-r AML 患者临床资料, 探讨此种类型白血病的临床特征及预后危险因素, 旨在为改善此种类型白血病预后提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2017 年 1 月至 2021 年 11 月中国科学技术大学附属第一医院 (安徽省立医院) 血液内科收治的 17 例 MLL-r B-ALL 和 25 例 MLL-r AML 患者资料, 其中男性 14 例, 女性 28 例, 年龄 (39.21±14.23) 岁。本研究经中国科学技术大学附属第一医院 (安徽省立医院) 医学伦理委员会批准 (编号: 2022-RE-330)。

1.2 纳入排除标准 纳入标准: ①年龄≥14 岁; ②具有典型 11q23/MLL 白血病染色体易位和/或 MLL 相关融合基因重排阳性 ALL 或者 AML。排除标准: ①年龄<14 岁; ②慢性白血病。

1.3 方法

1.3.1 实验室检查 使用染色体 G 显带技术, 分析染色体易位, 最常见的 11q23/MLL 白血病染色体易位包括 t(4; 11)(q21; q23)、t(9; 11)(p22; q23)、t(11; 19)(q23; p13)、t(10; 11)(p12; q23) 和 t(6; 11)(q27; q23)。采用多重巢式反转录-聚合酶链反应 (reverse transcription-polymerase chain reaction, RT-PCR) 方法筛选 12 种 MLL 相关融合基因 (包括 MLL-AF4、MLL-AF9、MLL-AF10、MLL-ENL、MLL-ELL、MLL-AF17、MLL-AF1q、MLL-AF1p、MLL-AF6、MLL-Afx、MLLex5-9/MLLex2 和 MLL-SEPT6)。

1.3.2 治疗方案 根据患者年龄、化疗的耐受性、有无血液病史、是否合并中枢神经系统白血病及有无髓外病变等情况, 制定合适的治疗方案。AML 患者治疗方案参照《中国成人急性髓系白血病 (非急性早幼粒细胞白血病) 诊疗指南 (2021 年版)》^[8], ALL 患者治疗方案参照《中国成人急性淋巴细胞白血病诊断与治疗指

南 (2021 年版)》^[9]。所有患者化疗后均检测白血病微小残留病 (minimal residual disease, MRD), 达到临床缓解后接受预防性鞘内注射治疗。年龄≤60 岁, 且有合适供者情况下, 建议进行异基因造血干细胞移植。

1.4 观察指标 阳性终点事件为患者死亡, 总生存期 (overall survival, OS) 指从白血病确诊到随访截止或者患者死亡。

1.5 随访 通过查阅病例资料或者电话随访患者及家属, 随访至 2022 年 8 月 31 日。

1.6 统计学方法 使用 Graphpad prism 9.3 画图, 使用 SPSS 24.0 分析数据。正态分布计量资料用 $\bar{x} \pm s$ 表示; 偏态分布计量资料用 $M(P_{25}, P_{75})$ 表示; 计数资料以百分比表示, 两组间率的比较采用 χ^2 检验; Kaplan-Meier 生存曲线进行生存分析, 组间比较采用 Log-rank 检验; 多因素 COX 回归分析患者预后危险因素。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者临床特征 42 例患者中 40 例患者 MLL 相关融合基因重排阳性, 2 例患者 MLL 相关融合基因阴性, 但伴有 t(9; 11)(p22; q23) 染色体易位, 具体临床资料见表 1。血常规结果显示, 患者多表现为外周血白细胞 (white blood cell, WBC) 异常升高, 血红蛋白及血小板减少, 31 例 (73.81%) 患者 WBC 异常升高, 其中 19 例 (45.24%) 患者 WBC>50×10⁹/L, 10 例 (23.81%) 患者 WBC>100×10⁹/L, 见图 1A。染色体检查结果显示, 18 例 (42.86%) 患者伴有 11q23 染色体易位, 其中 8 例 (19.05%) 患者伴有 t(4; 11) 染色体易位, 6 例 (14.29%) 患者伴有 t(9; 11) 染色体易位, 4 例 (9.52%) 患者伴有 t(6; 11) 染色体易位。17 例 MLL-r B-ALL 患者中 16 例 (94.12%) 为 MLL-AF4 重排, 1 例 (5.88%) 为 MLL-ENL 重排, 见图 1B。25 例 MLL-r AML 患者中 8 例 (32.00%) 为 MLL-AF9 重排, 8 例 (32.00%) 为 MLL-AF6 重排, 3 例 (12.00%) 为 MLL-ELL 重排, 2 例 (8.00%) 为 MLL-AF10 重排, 1 例 (4.00%) 为 MLL-PTD 重排, 1 例 (4.00%) 为 MLL-ENL 重排, 剩余 2 例 (8.00%) MLL 相关融合基因阴性, 但伴有 t(9; 11)(p22; q23) 染色体易位, 见图 1C。

2.2 治疗疗效评估 42 例患者中 20 例存活, 21 例死亡, 仅 1 例 MLL-r B-ALL 患者失访 (该患者失访日期为 2017 年 11 月 16 日, 未接受造血干细胞移植, 计算 OS 时删除失访患者)。41 例 (97.62%) 首次诱导采用常规化疗, 另 1 例采用脐带血微移植临床试验 (临床试验编号: NCT04174586, 伦理批件号: 2019KY 伦审第 160 号)。首次诱导治疗结束后, 32 例 (76.19%) 患者达

表 1 42 例 MLL-r 急性白血病患者临床资料

临床特征	MLL-r AML (n = 25)	MLL-r B-ALL (n = 17)
年龄(岁)	38.16±14.43	40.76±14.21
男性[例(%)]	9(36.00)	5(29.41)
诊断时白细胞计数 [例(%)]		
≥30×10 ⁹ /L	12(48.00)	15(88.24)
≥100×10 ⁹ /L	2(8.00)	8(47.06)
1 疗程治疗缓解[例(%)]	18(72.00)	14(82.35)
造血干细胞移植[例(%)]	12(48.00)	10(58.82)
非血缘脐血移植[例(%)]	8(32.00)	6(35.29)
其他类型移植[例(%)]	4(16.00)	4(23.53)

注:MLL-r 为混合谱系白血病基因重排,AML 为急性髓系白血病,B-ALL 为急性 B 淋巴细胞白血病。

到完全缓解(complete remission, CR),2 例(4.76%)患者达到部分缓解(partial remission, PR),剩余 8 例患者未缓解,总体反应率(overall response rate, ORR)为 80.95%。

进一步分析影响患者 OS 的因素,《中国成人急性髓系白血病(非急性早幼粒细胞白血病)诊疗指南(2021 年版)》^[8]指出诊断时年龄≥60 岁及 WBC≥100×

10⁹/L 是预后不良因素;具有 MLL-AF9 基因重排为预后中等,其他类型 MLL 重排为预后不良;《中国成人急性淋巴细胞白血病诊断与治疗指南(2021 年版)》^[9]指出 B-ALL 患者,诊断时年龄≥35 岁及 WBC≥30×10⁹/L 是预后不良因素;此外,造血干细胞移植可以改善患者预后。因此,采用进一步亚组分析及 COX 回归分析影响患者 OS 的因素。

首先将 25 例 AML 患者进一步分为 MLL-AF9 基因重排组(n=10)和其他 MLL 基因重排组(n=15),其中 2 例患者 MLL 相关融合基因阴性,但伴有 t(9;11)(p22;q23)染色体易位也纳入 MLL-AF9 基因重排组。两组 5 年的 OS 率分别为(56.0±17.1)%和(44.4±13.3)%,组间比较差异无统计学意义($\chi^2=0.087, P=0.769$),见图 2A。25 例 AML 患者中,仅 3 例患者年龄≥60 岁,2 例 WBC≥100×10⁹/L,因此,未按照年龄及白细胞计数进行进一步亚组分析。

42 例患者有 1 例患者失访,剩余 41 例随访患者分为单纯化疗组(n=19)和异基因造血干细胞移植组(n=22),两组 5 年的 OS 率分别为(13.2±8.3)%和(72.9±10.7)%,组间差异具有统计学意义($\chi^2=20.953, P<0.001$),见图 2B。将异基因造血干细胞移植组进一步分为非血缘脐血移植组(n=14)和其他类型移植组(包括同胞全合造血干细胞移植和亲缘单倍体移植,n=8),两组 3 年的 OS 率分别为(77.9±11.3)%和(41.7±30.4)%,组间比较差异无统计学意义($\chi^2=0.157, P=0.692$),见图 2C。

注:A 为 42 例 MLL-r 急性白血病患者白细胞计数特点圆形饼图;B 为 17 例 MLL-r B-ALL 患者不同 MLL 相关融合基因圆形饼图;C 为 25 例 MLL-r AML 患者不同 MLL 相关融合基因圆形饼图。

图 1 42 例 MLL-r 急性白血病患者白细胞及细胞遗传学特征

最后,使用 COX 回归分析影响患者 OS 的因素,多因素分析显示,诊断时白细胞计数≥100×10⁹/L 及异基因造血干细胞移植为影响 MLL-r AML 患者 OS 的因素;异基因造血干细胞移植为影响 MLL-r B-ALL 患者 OS 的因素。见表 2。

3 讨论

MLL 基因(又称为 KMT2A 基因),由 37 个外显子组成,定位于 11 号染色体 q23 区域,与果蝇的 trithorax(trx)基因具有较高的同源性^[10-11]。MLL 基因编码是一种组蛋白甲基转移酶,可以对组蛋白 H3 第 4 位赖氨酸进行甲基化修饰,调节下游靶基因如同源框(homeobox, HOX)等基因的转录,维持造血系统的稳态。

表 2 Cox 回归分析影响患者 OS 的因素

因素	单因素分析			多因素分析		
	HR 值	95%CI	P 值	HR 值	95%CI	P 值
MLL-r AML						
年龄≥60 岁	1.897	0.400 ~ 9.002	0.420			
男性	2.118	0.681 ~ 6.593	0.195			
MLL-AF9 基因重排	0.835	0.251 ~ 2.777	0.769			
诊断时白细胞≥100×10 ⁹ /L	3.135	0.672 ~ 14.615	0.146	8.030	1.327 ~ 48.594	0.023
接受造血干细胞移植	0.116	0.025 ~ 0.539	0.006	0.079	0.015 ~ 0.423	0.003
MLL-r B-ALL						
年龄≥35 岁	1.269	0.328 ~ 4.919	0.730			
男性	1.549	0.384 ~ 6.246	0.539			
诊断时白细胞≥30×10 ⁹ /L	0.909	0.112 ~ 7.408	0.929			
接受造血干细胞移植	0.054	0.006 ~ 0.481	0.009	0.054	0.006 ~ 0.481	0.009

注: OS 为总生存期; MLL-r AML 为混合谱系白血病基因重排急性髓系白血病; MLL-r B-ALL 为混合谱系白血病基因重排急性 B 淋巴细胞白血病。

注: A 为 25 例 MLL-r AML 分为 MLL-AF9 融合基因组和其他 MLL 基因重排组, 折线图显示两组 OS; B 为将 41 例患者分为单纯化疗组和异基因造血干细胞移植组, 折线图显示两组 OS; C 为 22 例接受异基因造血干细胞移植患者分为非血缘脐血移植组和其他类型移植组, 折线图显示两组 OS。

图 2 MLL-r 急性白血病患者生存分析

11q23 染色体易位引起 MLL 基因重排, 编码的 MLL 融合蛋白, 失去对下游靶基因的调控作用^[12-13]。WHO 已将具有 MLL 基因重排的急性白血病单独列为 11q23/MLL 白血病, 其具有独特的临床和生物学特征, 常表现为外周血白细胞异常升高、侵袭性强并容易发生中枢神经系统白血病, 单纯化疗复发率高, 总体预后差^[1, 14-15]。迄今为止, 已鉴定出约 135 种 MLL 相关融合基因, 5 种最常见的 11q23 染色体易位分别为 t(4; 11)(q21; q23)、t(6; 11)(q27; q23)、t(9; 11)(p22; q23)、t(10; 11)(p12; q23) 和 t(11; 19)(q23; p13), 对应的 MLL 相关融合基因分别为 MLL-AF4、MLL-AF6、MLL-AF9、MLL-AF10 和 MLL-ENL, 占全部 MLL-r 急性白血病的 80%^[14]。

MLL-r 急性白血病临床异质性较大, MLL-r ALL 主要为 B-ALL, T-ALL 相对罕见。MLL-r ALL 的发病率呈现为双峰型, 发病率在出生后的 2 年内达到高峰, 随后呈下降趋势, 老年患者发病率随着年龄的增长逐渐增加^[1]。MLL-r ALL 预后不良的一个重要原因是白

血病细胞出现耐药, 与其他类型的 ALL 相比较, MLL-r ALL 更容易对皮质类固醇和 L-天冬酰胺酶等药物耐药。最常见的重排类型为 MLL-AF4 重排, 约 75% 患者为 MLL-AF4 重排阳性, 其次为 MLL-ENL 重排^[1, 14, 16]。本研究中, 17 例 MLL-r B-ALL 患者中, 16 例为 MLL-AF4 重排, 1 例 (5.88%) 为 MLL-ENL 重排, 与文献报道基本一致。Richard-Carpentier 等^[16]回顾了 1984 年至 2019 年美国安德森癌症中心 (MD Anderson) 收治的 1102 例成人 ALL 患者, 其中 50 例 (5%) 患者具有 MLL 基因重排, 42 例为 MLL-AF4 重排阳性; 诊断时表现为外周血白细胞计数异常升高, 中位白细胞计数为 109.03×10⁹/L, 5 年总生存率仅为 18%。MLL 基因重排, 包括 MLL-AF4 重排, 是急性淋巴细胞白血病的预后不良因素。

MLL-r AML 最常见的重排类型为 MLL-AF9 重排和 MLL-AF6 重排^[17]。具有 t(9; 11) 染色体易位或者 MLL-AF9 基因重排 AML 患者总体预后优于其他类型 MLL 基因重排 AML 患者, ELN 和 NCCN 指南亦将

MLL-AF9列为预后中危组,而其他类型的MLL基因重排为预后不良组^[18-19]。然而,需要注意的是,不同形式的MLL基因重排,移植后的生存亦存在差异。Pigneux等^[20]回顾性分析了159例接受了异基因造血干细胞移植的MLL基因重排AML患者,结果发现,t(9;11)和t(11;19)染色体易位患者2年OS率分别为(64±6)%和(73±10)%,而t(10;11)和t(6;11)染色体易位患者2年OS率分别为(40±13)%和(24±11)%;t(9;11)和t(11;19)染色体患者预后优于t(10;11)和t(6;11)染色体患者。本研究中,2例患者具有t(9;11)染色体易位,8例患者具有MLL-AF9基因重排,该10例患者的生存情况似乎并不非常乐观,5年OS为56.00%,可能与分析病例数过少有关。11q23/MLL白血病患者,达到临床缓解后,建议行造血干细胞移植术。

本研究结果发现,MLL基因重排成人急性白血病诊断时常表现为白细胞异常升高,B-ALL最常见的重排为MLL-AF4重排;AML最常见重排为MLL-AF9重排和MLL-AF6重排。此种类型白血病复发率高,异基因造血干细胞移植可以显著改善患者预后。MLL-r急性白血病达到临床缓解后,有合适供者情况下,应尽早行异基因造血干细胞移植。此外,使用COX回归分析影响患者OS的因素,诊断时高白细胞计数及异基因造血干细胞移植影响MLL-r AML患者OS的因素,而异基因造血干细胞移植是影响MLL-r B-AL患者OS的因素。诊断时白细胞 $\geq 100 \times 10^9/L$ 单因素分析无统计学意义,而多因素分析显示为影响MLL-r AML患者OS的因素,可能与高白细胞AML患者数量过少有关,25例AML患者中,仅2例WBC $\geq 100 \times 10^9/L$ 。本研究入组患者数较少,后期仍需要开展更大样本的临床研究。

参考文献

[1] EL CHAER F, KENG M, BALLEEN K K, et al. MLL-rearranged acute lymphoblastic leukemia[J]. *Curr Hematol Malig Rep*,2020, 15(2):83-89.

[2] OLIVEIRA T, ZHANG M, JOO E J, et al. Glycoproteome remodeling in MLL-rearranged B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia[J]. *Theranostics*, 2021, 11(19):9519-9537.

[3] WEN J, ZHOU M, SHEN Y, et al. Poor treatment responses were related to poor outcomes in pediatric B cell acute lymphoblastic leukemia with KMT2A rearrangements[J]. *BMC Cancer*,2022, 22(1):859.

[4] BRITTEN O, RAGUSA D, TOSI S, et al. MLL-rearranged acute leukemia with t(4;11)(q21;q23)-current treatment options. is there a role for CAR-T cell therapy? [J]. *Cells*, 2019, 8(11):1341.

[5] GAO L, SUN J, LIU F, et al. Higher expression levels of the HOXA9 gene, closely associated with MLL-PTD and EZH2 mutations, predict inferior outcome in acute myeloid leukemia [J]. *Onco Targets Ther*, 2016, 9:711-722.

[6] MANN G, ATTARBASCHI A, SCHRAPPE M, et al. Improved outcome with hematopoietic stem cell transplantation in a poor

prognostic subgroup of infants with mixed-lineage-leukemia (MLL)-rearranged acute lymphoblastic leukemia: results from the Interfant-99 Study[J]. *Blood*, 2010, 116(15):2644-2650.

[7] TSAKANELI A, WILLIAMS O, et al. Drug repurposing for targeting acute leukemia with KMT2A (MLL)-gene rearrangements[J]. *Front Pharmacol*,2021, 12:741413.

[8] 中华医学会血液学分会白血病淋巴瘤学组,等. 中国成人急性髓系白血病(非急性早幼粒细胞白血病)诊疗指南(2021年版)[J]. *中华血液学杂志*, 2021,42(8): 617-623.

[9] 中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会,中华医学会血液学分会白血病淋巴瘤学组,等. 中国成人急性淋巴细胞白血病诊断与治疗指南(2021年版)[J]. *中华血液学杂志*, 2021, 42(9):705-716.

[10] TKACHUK D C, KOHLER S, CLEARY M L, et al. Involvement of a homolog of drosophila trithorax by 11q23 chromosomal translocations in acute leukemias[J]. *Cell*,1992, 71(4): 691-700.

[11] MARSCHALEK R. Systematic classification of mixed-lineage leukemia fusion partners predicts additional cancer pathways[J]. *Ann Lab Med*,2016, 36(2):85-100.

[12] KRIVTSOV A V, ARMSTRONG S A. MLL translocations, histone modifications and leukaemia stem-cell development [J]. *Nat Rev Cancer*,2007, 7(11):823-833.

[13] YOKOYAMA A. The mechanism of MLL-rearranged leukemogenesis and its targeted therapies[J]. *Rinsho Ketsueki*, 2021, 62(8):988-997.

[14] MEYER C, BURMEISTER T, GROGER D, et al. The MLL recombinome of acute leukemias in 2017[J]. *Leukemia*,2018, 32(2):273-284.

[15] QIU K Y, ZHOU D H, Liao X Y, et al. Prognostic value and outcome for acute lymphocytic leukemia in children with MLL rearrangement: a case-control study[J]. *BMC Cancer*, 2022, 22(1):1257.

[16] RICHARD-CARPENTIER G, KANTARJIAN H M, TANG G, et al. Outcomes of acute lymphoblastic leukemia with KMT2A (MLL) rearrangement: the MD Anderson experience [J]. *Blood Adv*,2021, 5(23):5415-5419.

[17] KONOPLEV S, WANG X, TANG G, et al. Comprehensive immunophenotypic study of acute myeloid leukemia with KMT2A (MLL) rearrangement in adults: A single-institution experience[J]. *Cytometry B Clin Cytom*, 2022, 102(2): 123-133.

[18] POLLYEA D A, BIXBY D, PERL A, et al. NCCN Guidelines insights: acute myeloid leukemia, version 2.2021[J]. *J Natl Compr Canc Netw*,2021, 19(1):16-27.

[19] DOHNER H, WEI A H, APPELBAUM F R, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2022 recommendations from an international expert panel on behalf of the ELN[J]. *Blood*,2022, 140(12):1345-1377.

[20] PIGNEUX A, LABOPIN M, MAERTENS J, et al. Outcome of allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation for adult patients with AML and 11q23/MLL rearrangement (MLL-r AML) [J]. *Leukemia*,2015, 29(12):2375-2381.